

**RESIDÊNCIA MÉDICA 2007**

***Endocrinologia***

**(Questões teórico-práticas)**

**INSTRUÇÕES**

1	Identifique-se na <b>parte inferior</b> desta capa. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo.
2	Este Caderno contém 01 caso clínico e respectivas questões. Verifique se está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
3	O valor total do caso clínico vem indicado na própria questão.
4	Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
5	Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.
6	O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
7	Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões.
8	Antes de retirar-se definitivamente da sala, <b>devolva este Caderno</b> ao Fiscal.

**Identificação do Candidato**

Nome completo (em letra de forma)		Nº da Inscrição
▶		▶
Nº da Turma	Assinatura	
▶	▶	

## Caso Clínico (10,00 pontos)

Paciente de 23 anos, branca, natural de Pau dos Ferros/RN, queixa-se de que, há seis meses, observou, na região anterior direita do pescoço, um nódulo endurecido, com crescimento maior nos últimos 15 dias. Nega queixas cardiopulmonares, gastrointestinais e neurológicas. Ciclos menstruais normais. Nega ter sido submetida a radioterapia na adolescência. Nega tabagismo e etilismo.

**Antecedentes familiares** – Tia materna com hipotireoidismo primário, mãe portadora de vitiligo e avó materna com história de artrite reumatóide.

**Exame físico** – Peso: 45 kg; altura: 1,60 m; corada e hidratada. Palpação cervical: tireóide aumentada em decorrência de um nódulo de consistência firme, localizado no lobo superior do lado direito, móvel à deglutição, indolor à palpação. Ausência de hipertrofia ganglionar regional.

**Exames subsidiários** – TSH 1,8mUI/mL; T4 livre 1,0 ug/mL (normais).

**Ultra-sonografia tireoideana** – Presença de nódulo sólido, medindo 2,0 x 1,5 x 1,0cm, hipoecóico, limites imprecisos, textura heterogênea. Restante do tecido tiroideano normal. Ausência de adenomegalia cervical.

Com base nesse caso, responda aos subitens que seguem.

- A) Quais as três hipóteses diagnósticas mais prováveis?
- B) Considerando essas hipóteses, indique, respectivamente, a conduta a ser adotada. Justifique.
- C) Qual a ordem decrescente da frequência dessas patologias na população em geral?
- D) Qual exame complementar deve ser solicitado para orientação terapêutica do caso?
- E) Como deve ser conduzida a evolução desse caso? Justifique.
- F) Estabeleça uma relação entre as doenças auto-imunes e as patologias tiroideanas.

---

Espaço para a resposta

---

---

Continuação da resposta

---

Fim do espaço para a resposta