

## RESIDÊNCIA MÉDICA 2007

### Medicina Intensiva

#### (Questões teórico-práticas)

### INSTRUÇÕES

1	Identifique-se na <b>parte inferior</b> desta capa. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo.
2	Este Caderno contém 01 caso clínico e respectivas questões. Verifique se está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
3	O valor total do caso clínico vem indicado na própria questão.
4	Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
5	Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.
6	O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
7	Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões.
8	Antes de retirar-se definitivamente da sala, <b>devolva este Caderno</b> ao Fiscal.

### Identificação do Candidato

Nome completo (em letra de forma)		Nº da Inscrição
▶		▶
Nº da Turma	Assinatura	
▶	▶	

### **Caso Clínico** (10,00 pontos)

Um homem de 48 anos chega ao serviço de emergência apresentando intenso desconforto precordial do tipo constritivo, com irradiação para o membro superior esquerdo e para a região cervical, náuseas, sudorese fria e profusa, além de ansiedade.

Ele nunca havia apresentado quadro clínico semelhante, e esses sintomas tiveram início de forma súbita, fazia mais ou menos 30 minutos.

O paciente é obeso, sedentário e trabalha embarcado em sonda de exploração de petróleo, no grupo de prevenção contra incêndio. É tabagista há mais de 20 anos e costuma fumar 20 cigarros diariamente.

Ao exame físico inicial, verifica-se o ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com presença de 4ª bulha, frequência cardíaca de 98 bpm e pressão arterial de 100/60 mm Hg. O eletrocardiograma não revela alterações em segmento ST e/ou onda T nem distúrbios de condução intraventricular.

É medicado com Nitrato sublingual, antiemético e solução analgésica (morfina). Passados 15 minutos, o paciente ainda refere os mesmos sintomas e apresenta sinais de baixo débito.

OBS.: É colhido sangue venoso logo que o paciente chega ao hospital, e as dosagens de CKMB e Troponias encontram-se em níveis normais.

Considerando o relato acima, responda, nas folhas seguintes, nos respectivos espaços destinados à resposta, aos subitens A, B, C e D.

**A)** Visando ao diagnóstico, explicite qual deve ser a conduta inicial.

---

Espaço para a resposta

---

Fim do espaço

**B)** Visando à terapêutica imediata, explicite qual deve ser a conduta inicial.

---

Espaço para a resposta

---

Fim do espaço

**C)** Visando à terapêutica de manutenção na fase hospitalar, explicite qual deve ser a conduta inicial.

---

Espaço para a resposta

---

Fim do espaço

**D)** Visando ao seguimento a longo prazo, explicita qual deve ser a conduta inicial.

---

Espaço para a resposta

---

Fim do espaço