

RESIDÊNCIA MÉDICA 2007

Urologia

(Questões teórico-práticas)

INSTRUÇÕES

| | |
|---|--|
| 1 | Identifique-se na parte inferior desta capa. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo. |
| 2 | Este Caderno contém 03 casos clínicos e respectivas questões. Verifique se está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal. |
| 3 | O valor total de cada caso clínico vem indicado na própria questão. |
| 4 | Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo. |
| 5 | Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos. |
| 6 | O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho. |
| 7 | Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões. |
| 8 | Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva este Caderno ao Fiscal. |

Identificação do Candidato

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| Nome completo (em letra de forma) | | Nº da Inscrição |
| ▶ | | ▶ |
| Nº da Turma | Assinatura | |
| ▶ | ▶ | |

Caso Clínico 1 (4,00 pontos)

Paciente do sexo masculino, 55 anos, queixa-se de dor lombar D, de início súbito, acompanhada de náuseas e vômitos há cinco dias. Antes de chegar ao PS, sentiu mal-estar. Ao exame clínico, foram detectados temperatura de 38°C e sinal de Giordano positivo.

Com base nesse caso, responda aos subitens que seguem.

- A)** Qual o provável diagnóstico?
- B)** Que exames são necessários para se chegar seguramente ao diagnóstico e para se dar início à terapêutica? Justifique.
- C)** Confirmado o diagnóstico, qual deve ser a escolha terapêutica?
- D)** Qual a conduta recomendada após o tratamento?

Espaço para a resposta

Resposta ao Caso Clínico 1 (continuação)

Fim do espaço para a resposta

Caso Clínico 2 (3,00 pontos)

Paciente do sexo masculino, 60 anos, queixa-se de dificuldade miccional surgida há nove meses, com progressivo agravamento do quadro. Nega antecedentes urológicos.

Com base nesse caso, responda aos subitens abaixo.

- A)** Qual o provável diagnóstico e como se deve proceder à avaliação mínima?
- B)** Que exames são necessários para se chegar seguramente ao diagnóstico e para se dar início à terapêutica? Justifique.
- C)** Confirmado o diagnóstico, quais devem ser as escolhas terapêuticas?

Espaço para a resposta

Resposta ao Caso Clínico 2 (continuação)

Fim do espaço para a resposta

Caso Clínico 3 (3,00 pontos)

Paciente do sexo feminino, 30 anos, vítima de atropelamento, chegou ao PS trazida pelo SAMU. Ao exame inicial, estava consciente, queixando-se de dores abdominais e lombares. Estava eupnéica, com FC de 110bpm e PA de 80x50mmHg, que se normalizou após reposição de 2000ml de solução salina. Apresentava escoriações e discreta dor na região tóraco-lombar D. Hematócrito de 36% e EAS com 17 hemáceas por campo.

Responda, com base nessa situação, aos subitens a seguir.

A) Qual o provável diagnóstico?

B) Que exames são necessários para se chegar seguramente ao diagnóstico e para se dar início à terapêutica? Justifique.

C) Confirmado o diagnóstico, qual deve ser a escolha terapêutica?

| |
|------------------------|
| Espaço para a resposta |
|------------------------|

Resposta ao Caso Clínico 3 (continuação)

Fim do espaço para a resposta