

PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

Concurso Público

Aplicação: 17/08/2003

CARGO:
MÉDICO CARDIOLOGIA - 117

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno é constituído de 40 questões assim distribuídas: Conhecimentos Gerais, de 01 a 12; e Conhecimentos Específicos, de 13 a 40.
2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis.
3. Cada questão contém quatro opções de resposta, sendo apenas uma a correta.
4. A duração da prova é de quatro horas.
5. Terminada a prova, o candidato entregará a folha de respostas e o caderno de questões ao fiscal.
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas instruções ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

Nº INSCRIÇÃO _____

Questão 01

No que se refere ao prontuário médico, é **correto** afirmar que

- A) o paciente, em caso de erro médico, só pode ter acesso ao seu prontuário sob ordem judicial.
- B) é permitido ao médico negar acesso ao paciente a seu prontuário, ficha clínica ou similar.
- C) o paciente não pode manusear o prontuário, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional.
- D) é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente.

Questão 02

Avalie as afirmações abaixo, que se referem à relação do médico com o paciente.

- 1 - É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa causa.
- 2 - É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou seu representante legal.
- 3 - É dever do médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento.

Estão **corretas** as seguintes afirmações:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 3.

Questão 03

Sobre os modelos assistenciais, é **incorreto** afirmar que

- A) o modelo sanitista tem enfrentado os problemas de saúde da população por meio de campanhas e programas especiais.
- B) o modelo sanitista e o modelo médico-assistencial privatista coexistem de forma contraditória ou complementar no Brasil.
- C) o modelo assistencial privatista está voltado fundamentalmente para a chamada demanda espontânea.
- D) o modelo médico-assistencial privatista é o menos prestigiado, embora contemple o conjunto de problemas de saúde da população brasileira.

Questão 04

Sobre o atestado médico, é **correto** afirmar que

- A) é obrigatória a citação do CID em todos os casos.
- B) é direito inquestionável do paciente.
- C) pode importar em majoração de honorários profissionais
- D) é procedimento legal para angariar clientela.

Questão 05

Sobre a mistanásia, é **correto** afirmar que

- A) é o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente.
- B) é a morte miserável fora e antes do seu tempo.
- C) guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente.
- D) visa propiciar a morte sem dor.

Questão 06

Quanto ao erro médico, é **correto** afirmar:

- A) justifica-se em casos de excesso de trabalho e conseqüente desgaste profissional.
- B) a instituição fica isenta de culpa, quando há grande sobrecarga de atendimentos.
- C) o médico que se omitiu em um atendimento é penalizado, sendo considerado imprudente.
- D) em caso de excesso de trabalho, o médico e a instituição serão responsabilizados.

Questão 07

É **correto** afirmar que surto epidêmico

- A) tem rápida progressão até atingir a incidência máxima num intervalo de tempo.
- B) é o aumento do número total de casos, superando o valor endêmico.
- C) é a ocorrência de uma série de epidemias.
- D) tem ocorrência epidêmica restrita a espaço delimitado.

Questão 08

Em caso de acidente biológico, é **correto** afirmar que

- A) o risco de aquisição do vírus da hepatite B, em paciente não imunizado, de fonte positiva é inúmeras vezes mais freqüente que o HIV de fonte positiva.
- B) as práticas de biossegurança em manipulação de pacientes considerados grupos de risco devem ser amplas e distintas do restante.
- C) o primeiro procedimento será pesquisar sorologias positivas no prontuário do paciente.
- D) a prescrição de um único anti-retroviral é aconselhável, pelos efeitos colaterais das drogas.

Questão 09

Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a conduta imediata **mais correta** será

- A) lavar com PVPI degermante e, a seguir, usar o PVPI tópico.
- B) lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido.
- C) lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar anti-séptico.
- D) fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão.

Questão 10

A infecção hospitalar se manifesta

- A) após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos invasivos.
- B) durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou procedimento.
- C) obrigatoriamente após procedimentos invasivos realizados no hospital em questão.
- D) sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas.

Questão 11

Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-negativos e cultura de secreção abdominal positiva para *Proteus mirabilis*, a **melhor** opção terapêutica é

- A) amicacina e metronidazol.
- B) oxacilina e metronidazol.
- C) clindamicina e fluconazol.
- D) cefotaxima e amicacina.

Questão 12

Em relação à vigilância sanitária, é **correto** afirmar que

- A) é um conjunto de medidas que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias.
- B) a vigilância sanitária atua sobre os fatores de risco à saúde, porém sem ação normativa sobre a industrialização e armazenamento.
- C) não tem atuação sobre ações de normatização e controle do meio ambiente.
- D) é um conjunto de normatizações sobre a prestação de serviços e atividades, independente da relação com a saúde.

Questão 13

O TE é comumente indicado na seguinte situação:

- A) para excluir pericardite aguda.
- B) na confirmação diagnóstica de valvopatias.
- C) na vigência de IAM.
- D) avaliação de dor torácica com fatores de risco coronariano.

Questão 14

O fator que influencia positivamente no valor preditivo do TE é o(a)

- A) desnivelamento de ST descendente.
- B) ausência de dor ao exercício.
- C) desnivelamento de ST ascendente.
- D) sexo feminino.

Questão 15

O protocolo de Bruce modificado deve ser utilizado em que situação?

- A) Indivíduos com limitações físicas importantes.
- B) Indivíduos com algum grau de condicionamento físico.
- C) Indivíduos idosos e não treinados.
- D) Em portadores de ICC compensadas.

Questão 16

Cada equivalente metabólico (MET) corresponde ao consumo de

- A) 5 ml de O_2 /Kg/m.
- B) 4 ml de O_2 /kg/m.
- C) 3,5 ml de O_2 /kg/m.
- D) 5,5 ml de O_2 /kg/m.

Questão 17

Que alterações eletrocardiográficas **melhor** indicam isquemia miocárdica ao TE?

- A) Alterações morfológicas do segmento ST.
- B) Alterações da amplitude da onda T.
- C) Alterações da amplitude da onda R.
- D) Alterações morfológicas da onda U.

Questão 18

Com relação ao desnivelamento superior do segmento ST ao TE, é **correto** afirmar que

- A) pode representar isquemia miocárdica severa.
- B) a elevação do segmento ST é um achado freqüente.
- C) é uma alteração específica de isquemia, mesmo em área com onda Q patológica.
- D) a elevação do segmento ST em aVR é específica de isquemia miocárdica.

Questão 19

Assinale a opção que apresenta alterações fisiológicas da pressão arterial ao esforço.

- A) Diminuição da pressão sistólica e diastólica.
- B) Aumento progressivo das pressões sistólicas e diastólicas.
- C) Aumento da pressão sistólica e elevação importante da pressão diastólica.
- D) Elevação gradual da pressão sistólica com manutenção ou diminuição da pressão diastólica.

Questão 20

Durante a realização do TE, o que representa a queda importante da pressão arterial sistólica no pico do esforço é o

- A) achado freqüente no sexo feminino.
- B) indicativo de déficit inotrópico.
- C) comportamento normal da pressão arterial.
- D) achado freqüente em indivíduos com baixo desempenho físico.

Questão 21

Como se determina a freqüência cardíaca **máxima** prevista no TE?

- A) 210 menos a idade.
- B) 190 menos a idade.
- C) 200 menos a idade.
- D) 220 menos a idade.

Questão 22

Que outro valor da pressão arterial se considera como eficaz na interpretação do TE?

- A) 90% da FC máxima prevista.
- B) 50% da FC máxima prevista.
- C) 70% da FC máxima prevista.
- D) 85% da FC máxima prevista.

Questão 23

Qual dos fatores não interfere significativamente na interpretação do TE?

- A) Hipertensão ventricular esquerda.
- B) Bloqueio de ramo direito.
- C) Anormalidades prévias de ST-T maior que 1mm.
- D) Indivíduos em uso de digitálicos.

Questão 24

Com relação ao sintoma de dor precordial ao esforço, podemos afirmar :

- A) ocorre mais freqüentemente em pacientes diabéticos.
- B) só tem valor diagnóstico, se associada a alterações eletrocardiográficas.
- C) é de valor diagnóstico, mesmo na ausência de alterações eletrocardiográficas.
- D) não tem valor diagnóstico.

Questão 25

Qual das patologias não contra-indica o TE?

- A) Angina estável.
- B) Miocardite e pericardite aguda.
- C) Estenose aórtica severa.
- D) Insuficiência cardíaca descompensada.

Questão 26

Em que situação devemos interromper o TE (esforço)?

- A) Presença de BAV do 1º grau.
- B) Aparecimento de extra-sístoles ventriculares.
- C) Desnívelamento do segmento ST superior a 3 mm.
- D) Aparecimento de bloqueio de ramo direito.

Questão 27

Com relação ao TE, podemos afirmar que

- A) é um exame seguro e com baixa incidência de complicações.
- B) há incidência relativamente alta de morte ou IAM.
- C) as arritmias são importantes preditores de isquemia miocárdica.
- D) é exame considerado de alto risco.

Questão 28

Qual o objetivo principal do TE nos indivíduos aparentemente saudáveis?

- A) Avaliação funcional para admissão ao trabalho.
- B) Programação de exercícios físicos.
- C) Avaliação funcional para tratamento de obesidade.
- D) Avaliação funcional para fins de risco operatório.

Questão 29

Qual o objetivo principal do TE nos portadores de coronariopatia estável?

- A) Definir a melhor indicação terapêutica.
- B) Diagnosticar hipertensão reativa.
- C) Estratificação de risco.
- D) Avaliação da função do VE.

Questão 30

Com relação às arritmias ventriculares evidenciadas durante o esforço, podemos afirmar que

- A) sua frequência não tem relação com a idade.
- B) as extra-sístoles ventriculares esforço induzidas têm alta especificidade para isquemia miocárdica.
- C) têm maior especificidade quando surgem em cargas baixas ou associadas a alterações de segmento ST.
- D) têm baixa incidência em indivíduos normais.

Questão 31

O protocolo mais usado em bicicleta ergométrica é o protocolo de

- A) Bruce.
- B) Ellestad.
- C) Naughton.
- D) Astrand.

Questão 32

Qual das situações **não** constitui contra-indicação absoluta para programas de exercício?

- A) Miocardiopatia hipertrófica obstrutiva.
- B) PA de repouso acima de 200 x 100 mmHg.
- C) Síndrome isquêmica instável.
- D) Diabetes.

Questão 33

Com relação à variação do prognóstico no período pós-IAM, assinale a opção **correta**.

- A) A prova de esforço deve ser feita antes da alta hospitalar.
- B) A monitorização eletrocardiográfica ambulatorial deve ser feita em todos os pacientes que tiveram IAM recente.
- C) O TE máximo deve ser realizado antes da alta hospitalar.
- D) A realização de TE no pós-IAM recente constitui contra-indicação absoluta.

Questão 34

Assinale a opção **incorreta** com relação a arritmias no TE.

- A) O TE é mais sensível que o holter de 24 h para detectar arritmias.
- B) A taquicardia ventricular não sustentada com menos de 6 bpm pode ocorrer em indivíduos normais.
- C) O TE é contra-indicado nos pacientes com história prévia de arritmia ventricular grave.
- D) Aproximadamente 1/3 dos indivíduos normais apresenta extra-sístoles ventriculares durante o TE.

Questão 35

Qual dos métodos complementares **não** se associa ao TE na avaliação de cardiopatas?

- A) Ressonância magnética.
- B) Ventriculografia radio-isotópica.
- C) Ecocardiografia de stress.
- D) Cintilografia de perfusão miocárdica.

Questão 36

O steady state é atingido quando alcança o(a)

- A) estabilização entre FC, frequência respiratória e PA.
- B) pico máximo de PA.
- C) frequência cardíaca (FC) máxima.
- D) fase de exaustão física.

Questão 37

Qual dos parâmetros abaixo não eleva o MVO₂ miocárdico?

- A) Índice tensão-tempo.
- B) Frequência cardíaca(FC).
- C) Contratilidade miocárdica.
- D) Diminuição do diâmetro cavitário ventricular.

Questão 38

Com relação à estenose aórtica, é **correto** afirmar:

- A) no teste ergométrico, a acentuada redução do VO₂ máximo, angina e dispnéia pode estar relacionada com valvopatia severa.
- B) na indicação cirúrgica, o teste ergométrico não é de utilidade.
- C) o teste ergométrico é contra-indicado pela alta incidência de arritmia grave.
- D) o teste ergométrico é um excelente método de avaliação da capacidade funcional da estenose aórtica severa.

Questão 39

Em qual eventualidade o TE **não** pode ser realizado?

- A) Trombose venosa periférica.
- B) Enfisema pulmonar.
- C) Insuficiência arterial periférica.
- D) Asma brônquica.

Questão 40

Para o diagnóstico de isquemia miocárdica no TE, devem-se suspender

- A) os hipolipemiantes, os antiagregantes plaquetários e os inibidores de angiotensina II.
- B) os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de Ca e os nitrados.
- C) o inibidor de ECA, o hipoglicemiante e os sedativos.
- D) os hormônios tireoideanos, os broncodilatadores e os vasodilatadores periféricos.