

# PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

## Concurso Público

Aplicação: 17/08/2003

**CARGO:**

**MÉDICO CIRURGIA PLÁSTICA - 122**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno é constituído de 40 questões assim distribuídas: Conhecimentos Gerais, de 01 a 12; e Conhecimentos Específicos, de 13 a 40.
2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis.
3. Cada questão contém quatro opções de resposta, sendo apenas uma a correta.
4. A duração da prova é de quatro horas.
5. Terminada a prova, o candidato entregará a folha de respostas e o caderno de questões ao fiscal.
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas instruções ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

Nº INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_



---

### Questão 01

No que se refere ao prontuário médico, é **correto** afirmar que

- A) o paciente, em caso de erro médico, só pode ter acesso ao seu prontuário sob ordem judicial.
- B) é permitido ao médico negar acesso ao paciente a seu prontuário, ficha clínica ou similar.
- C) o paciente não pode manusear o prontuário, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional.
- D) é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente.

### Questão 02

Avalie as afirmações abaixo, que se referem à relação do médico com o paciente.

- 1 - É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa causa.
- 2 - É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou seu representante legal.
- 3 - É dever do médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento.

Estão **corretas** as seguintes afirmações:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 3.

### Questão 03

Sobre os modelos assistenciais, é **incorreto** afirmar que

- A) o modelo sanitário tem enfrentado os problemas de saúde da população por meio de campanhas e programas especiais.
- B) o modelo sanitário e o modelo médico-assistencial privatista coexistem de forma contraditória ou complementar no Brasil.
- C) o modelo assistencial privatista está voltado fundamentalmente para a chamada demanda espontânea.
- D) o modelo médico-assistencial privatista é o menos prestigiado, embora contemple o conjunto de problemas de saúde da população brasileira.

### Questão 04

Sobre o atestado médico, é **correto** afirmar que

- A) é obrigatória a citação do CID em todos os casos.
- B) é direito inquestionável do paciente.
- C) pode importar em majoração de honorários profissionais
- D) é procedimento legal para angariar clientela.

---

### Questão 05

Sobre a mistanásia, é **correto** afirmar que

- A) é o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente.
- B) é a morte miserável fora e antes do seu tempo.
- C) guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente.
- D) visa propiciar a morte sem dor.

### Questão 06

Quanto ao erro médico, é **correto** afirmar:

- A) justifica-se em casos de excesso de trabalho e conseqüente desgaste profissional.
- B) a instituição fica isenta de culpa, quando há grande sobrecarga de atendimentos.
- C) o médico que se omitiu em um atendimento é penalizado, sendo considerado imprudente.
- D) em caso de excesso de trabalho, o médico e a instituição serão responsabilizados.

### Questão 07

É **correto** afirmar que surto epidêmico

- A) tem rápida progressão até atingir a incidência máxima num intervalo de tempo.
- B) é o aumento do número total de casos, superando o valor endêmico.
- C) é a ocorrência de uma série de epidemias.
- D) tem ocorrência epidêmica restrita a espaço delimitado.

### Questão 08

Em caso de acidente biológico, é **correto** afirmar que

- A) o risco de aquisição do vírus da hepatite B, em paciente não imunizado, de fonte positiva é inúmeras vezes mais freqüente que o HIV de fonte positiva.
- B) as práticas de biossegurança em manipulação de pacientes considerados grupos de risco devem ser amplas e distintas do restante.
- C) o primeiro procedimento será pesquisar sorologias positivas no prontuário do paciente.
- D) a prescrição de um único anti-retroviral é aconselhável, pelos efeitos colaterais das drogas.

### Questão 09

Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a conduta imediata **mais correta** será

- A) lavar com PVPI degermante e, a seguir, usar o PVPI tópico.
- B) lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido.
- C) lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar anti-séptico.
- D) fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão.

---

---

### Questão 10

A infecção hospitalar se manifesta

- A) após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos invasivos.
- B) durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou procedimento.
- C) obrigatoriamente após procedimentos invasivos realizados no hospital em questão.
- D) sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas.

### Questão 11

Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-negativos e cultura de secreção abdominal positiva para *Proteus mirabilis*, a **melhor** opção terapêutica é

- A) amicacina e metronidazol.
- B) oxacilina e metronidazol.
- C) clindamicina e fluconazol.
- D) cefotaxima e amicacina.

### Questão 12

Em relação à vigilância sanitária, é **correto** afirmar que

- A) é um conjunto de medidas que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias.
- B) a vigilância sanitária atua sobre os fatores de risco à saúde, porém sem ação normativa sobre a industrialização e armazenamento.
- C) não tem atuação sobre ações de normatização e controle do meio ambiente.
- D) é um conjunto de normatizações sobre a prestação de serviços e atividades, independente da relação com a saúde.

### Questão 13

As fraturas na mandíbula ocorrem mais freqüentemente no (a)

- A) sínfise.
- B) processo coronóide.
- C) côndilo.
- D) ângulo.

---

### Questão 14

Assinale opção **incorreta**.

- A) As incidências mais utilizadas são em ântero-posterior e perfil.
- B) As lesões do maxilar superior podem determinar lesão da artéria maxilar interna.
- C) A prioridade inicial é com as vias aéreas.
- D) O exame clínico não contribui para o diagnóstico de fraturas faciais.

### Questão 15

Em relação à seqüência da fenda labial, uma das afirmativas está **incorreta**.

- A) O risco de recorrência é de 2,7%, quando unilateral, e de 5,4%, quando bilateral.
- B) É mais freqüente no sexo masculino.
- C) O risco de recorrência independe de ser o pai ou a mãe afetados.
- D) Quando o pai é afetado, o risco de recorrência é de 3%; e, quando a mãe é afetada, o risco de recorrência é de 14%.

### Questão 16

Um paciente sofreu queimadura de tórax, abdome e membro superior esquerdo com água fervente. Deve-se esperar

- A) queimaduras de 2º grau em toda a área.
- B) queimaduras de 3º grau no tórax e 2º grau no restante.
- C) queimaduras de 3º grau em toda a área.
- D) queimaduras de 2º grau no centro e 3º grau nas bordas.

### Questão 17

Nas opções abaixo, identifique o(s) músculo(s) **não** inervado(s) pelo nervo facial.

- A) Elevador da pálpebra.
- B) Orbicular dos lábios.
- C) Elevador do ângulo da boca.
- D) Próceros.

### Questão 18

O ramo temporal do nervo facial inerva os seguintes músculos:

- A) corrugador do supercílio, frontal, prócero.
- B) orbicular dos olhos, frontal, corrugador do supercílio.
- C) frontal, prócero, orbicular dos olhos.
- D) corrugador do supercílio, oblíquo interno, oblíquo externo.

---

---

### Questão 19

A respeito da cicatrização, o que caracteriza a fase inflamatória de fibroplasia e maturação é, respectivamente,

- A) a vasodilatação, o aumento dos fibroblastos e a diminuição do fluxo capilar.
- B) a marginação dos leucócitos, o aumento do número de fibroblastos e a contração da ferida.
- C) a neoangiogênese, o aumento dos fibroblastos e a contração da ferida.
- D) a vasodilatação, a contração da ferida e a epitelização.

### Questão 20

Que vasos são nutrientes do retalho escapular, do reto abdominal, do peitoral maior e do grande dorsal, respectivamente?

- A) escapular, mamária interna, toracoacromial, e circunflexa escapular.
- B) circunflexa subescapular, epigástrica, torácica lateral e toracodorsal.
- C) circunflexa escapular, epigástrica, toracoacromial e toracodorsal.
- D) subescapular, axilar, epigástrica inferior e peitoral.

### Questão 21

A forma mais comum de hipospádia é

- A) perineal.
- B) penoescrotal.
- C) glandar e peniana.
- D) perineal e peniana.

### Questão 22

Com relação à queratose actínica, é **correto** afirmar que

- A) não é considerada lesão pré-maligna.
- B) é comum em regiões não expostas ao sol.
- C) pode evoluir para carcinoma espinocelular.
- D) pode evoluir para carcinoma basocelular.

### Questão 23

A síndrome de Ehler-Danlos caracteriza-se por

- A) hiper-elasticidade cutânea e cicatrização pobre.
- B) hiperplasia adrenal virilizante.
- C) fusão prematura dos ossos da face.
- D) agenesia de ovário e pescoço alado.

---

**Questão 24**

Com relação à ginecomastia, é **incorreto** afirmar que

- A) pode ser desencadeada por medicamentos.
- B) a melhor forma de tratamento é a lipoaspiração.
- C) aparece devido a distúrbios hormonais.
- D) é comum na cirrose hepática.

**Questão 25**

Entre retalhos iguais, de uma plástia em Z, o ângulo máximo que facilita a transposição é

- A) 90°
- B) 35°
- C) 25°
- D) 60°

**Questão 26**

O resultado estético de uma cicatriz é melhor quando a incisão na pele, em relação às fibras musculares subjacentes, é realizada do modo

- A) perpendicular.
- B) oblíquo.
- C) paralelo.
- D) arciforme.

**Questão 27**

Na fase proliferativa do processo de cicatrização das feridas, existe predominância celular de

- A) linfócitos.
- B) macrófagos.
- C) neutrófilos.
- D) fibroblastos.

**Questão 28**

O fechamento primário retardado, em vez de sutura imediata de uma ferida contaminada, resulta mais freqüentemente em

- A) diminuição da infecção da ferida.
- B) enfraquecimento da ferida.
- C) cicatriz defeituosa.
- D) deiscência da ferida.



---

---

**Questão 29**

A síntese e remodelação das fibras de colágeno, durante o processo de cicatrização, dependem da presença de

- A) serotonina.
- B) histamina.
- C) ácido ascórbico.
- D) bradicinina.

**Questão 30**

O câncer que mais comumente ocorre nas cicatrizes de queimadura é

- A) sarcoma.
- B) carcinoma de células escamosas.
- C) melanocarcinoma.
- D) carcinoma basocelular.

**Questão 31**

A fasciotomia descompressiva está indicada, principalmente, no caso de queimadura

- A) circunferencial do membro.
- B) posterior do membro superior.
- C) nantero-lateral do abdomen.
- D) da face.

**Questão 32**

A técnica de Le Mesurier para tratamento da fissura labial é baseada no princípio do retalho

- A) quadrangular.
- B) em Z.
- C) rotação.
- D) triangular.

**Questão 33**

A correção da orelha de abano, com técnica que secciona a cartilagem, é recomendada, principalmente, na idade de

- A) 3 anos.
- B) 2 anos.
- C) 6 anos.
- D) 4 anos.

---

**Questão 34**

Quando, numa cirurgia facial, ocorrer a anestesia definitiva do lóbulo da orelha, é porque houve lesão do nervo

- A) mandibular.
- B) facial.
- C) auricular posterior.
- D) cervical transverso.

**Questão 35**

A reinervação em pele transplantada oferece melhor sensibilidade em enxertos do tipo

- A) total.
- B) dermoepidêmico
- C) estampilhado.
- D) pediculado.

**Questão 36**

Para prevenir o excesso de tecido cicatricial em uma ferida, segue-se como conduta mais adequada

- A) o uso de fio absorvível no subcutâneo.
- B) a beta-terapia no pós-operatório.
- C) a eliminação de tensão no local.
- D) a injeção de esteróide no pré-operatório.

**Questão 37**

O fator etiológico mais comum na ocorrência de fissuras labiopalatais é considerado como

- A) estresse materno durante a 4ª e 5ª semana de gravidez.
- B) hereditariedade.
- C) deficiência materna de vitamina E e B.
- D) deficiência de ácido fólico.

**Questão 38**

Evidenciou-se, após o exame de um paciente acidentado, perda da sensibilidade e dificuldade de oposição do polegar. Logo, o nervo comprometido é o

- A) ulnar.
- B) mediano.
- C) radial.
- D) cutâneo medial do braço.

---

**Questão 39**

O fator mais importante na formação de úlceras de decúbito é a

- A) anestesia da área envolvida.
- B) hipoproteinemia.
- C) proeminência óssea.
- D) pressão externa não percebida.

**Questão 40**

Com relação aos tumores malignos de pele, é **correto** afirmar que

- A) a localização mais comum do carcinoma basocelular é a região dorsal.
- B) o carcinoma basocelular tem como tratamento de escolha cirurgia com radioterapia.
- C) o carcinoma epidermóide metastatiza para linfonodos regionais.
- D) o tratamento do carcinoma epidermóide é exclusivamente a radioterapia.