

PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

Concurso Público

Aplicação: 17/08/2003

CARGO:

MÉDICO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - 124

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno é constituído de 40 questões assim distribuídas: Conhecimentos Gerais, de 01 a 12; e Conhecimentos Específicos, de 13 a 40.
2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis.
3. Cada questão contém quatro opções de resposta, sendo apenas uma a correta.
4. A duração da prova é de quatro horas.
5. Terminada a prova, o candidato entregará a folha de respostas e o caderno de questões ao fiscal.
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas instruções ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

Nº INSCRIÇÃO _____

Questão 01

No que se refere ao prontuário médico, é **correto** afirmar que

- A) o paciente, em caso de erro médico, só pode ter acesso ao seu prontuário sob ordem judicial.
- B) é permitido ao médico negar acesso ao paciente a seu prontuário, ficha clínica ou similar.
- C) o paciente não pode manusear o prontuário, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional.
- D) é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente.

Questão 02

Avalie as afirmações abaixo, que se referem à relação do médico com o paciente.

- 1 - É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa causa.
- 2 - É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou seu representante legal.
- 3 - É dever do médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento.

Estão **corretas** as seguintes afirmações:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 3.

Questão 03

Sobre os modelos assistenciais, é **incorreto** afirmar que

- A) o modelo sanitário tem enfrentado os problemas de saúde da população por meio de campanhas e programas especiais.
- B) o modelo sanitário e o modelo médico-assistencial privatista coexistem de forma contraditória ou complementar no Brasil.
- C) o modelo assistencial privatista está voltado fundamentalmente para a chamada demanda espontânea.
- D) o modelo médico-assistencial privatista é o menos prestigiado, embora contemple o conjunto de problemas de saúde da população brasileira.

Questão 04

Sobre o atestado médico, é **correto** afirmar que

- A) é obrigatória a citação do CID em todos os casos.
- B) é direito inquestionável do paciente.
- C) pode importar em majoração de honorários profissionais
- D) é procedimento legal para angariar clientela.

Questão 05

Sobre a mistanásia, é **correto** afirmar que

- A) é o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente.
- B) é a morte miserável fora e antes do seu tempo.
- C) guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente.
- D) visa propiciar a morte sem dor.

Questão 06

Quanto ao erro médico, é **correto** afirmar:

- A) justifica-se em casos de excesso de trabalho e conseqüente desgaste profissional.
- B) a instituição fica isenta de culpa, quando há grande sobrecarga de atendimentos.
- C) o médico que se omitiu em um atendimento é penalizado, sendo considerado imprudente.
- D) em caso de excesso de trabalho, o médico e a instituição serão responsabilizados.

Questão 07

É **correto** afirmar que surto epidêmico

- A) tem rápida progressão até atingir a incidência máxima num intervalo de tempo.
- B) é o aumento do número total de casos, superando o valor endêmico.
- C) é a ocorrência de uma série de epidemias.
- D) tem ocorrência epidêmica restrita a espaço delimitado.

Questão 08

Em caso de acidente biológico, é **correto** afirmar que

- A) o risco de aquisição do vírus da hepatite B, em paciente não imunizado, de fonte positiva é inúmeras vezes mais freqüente que o HIV de fonte positiva.
- B) as práticas de biossegurança em manipulação de pacientes considerados grupos de risco devem ser amplas e distintas do restante.
- C) o primeiro procedimento será pesquisar sorologias positivas no prontuário do paciente.
- D) a prescrição de um único anti-retroviral é aconselhável, pelos efeitos colaterais das drogas.

Questão 09

Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a conduta imediata **mais correta** será

- A) lavar com PVPI degermante e, a seguir, usar o PVPI tópico.
- B) lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido.
- C) lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar anti-séptico.
- D) fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão.

Questão 10

A infecção hospitalar se manifesta

- A) após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos invasivos.
- B) durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou procedimento.
- C) obrigatoriamente após procedimentos invasivos realizados no hospital em questão.
- D) sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas.

Questão 11

Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-negativos e cultura de secreção abdominal positiva para *Proteus mirabilis*, a **melhor** opção terapêutica é

- A) amicacina e metronidazol.
- B) oxacilina e metronidazol.
- C) clindamicina e fluconazol.
- D) cefotaxima e amicacina.

Questão 12

Em relação à vigilância sanitária, é **correto** afirmar que

- A) é um conjunto de medidas que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias.
- B) a vigilância sanitária atua sobre os fatores de risco à saúde, porém sem ação normativa sobre a industrialização e armazenamento.
- C) não tem atuação sobre ações de normatização e controle do meio ambiente.
- D) é um conjunto de normatizações sobre a prestação de serviços e atividades, independente da relação com a saúde.

Questão 13

Condição que não se associa à carência de vitamina B12 :

- A) doença celíaca.
- B) gastrite crônica atrófica.
- C) ileite regional.
- D) úlcera duodenal.

Questão 14

O ferro é absorvido principalmente no

- A) íleo terminal.
- B) jejuno.
- C) esôfago.
- D) estômago e 1ª porção do duodeno.

Questão 15

O melhor tratamento para os portadores jovens de aplasia medular grave é

- A) andrógenos + vitamina B12.
- B) corticóide + andrógenos.
- C) transplante de medula óssea.
- D) esplenectomia + andrógenos.

Questão 16

Em relação à anemia de células falciformes, podemos afirmar que

- A) é um defeito qualitativo da hemoglobina.
- B) ferro + ácido fólico é o melhor tratamento.
- C) está indicada a esplenectomia.
- D) é conhecida como anemia de Cooley.

Questão 17

É(são) achado raro no mieloma múltiplo:

- A) lesões osteoblásticas.
- B) proteinúria de Bence-Jones.
- C) gamopatia monoclonal.
- D) dores ósseas generalizadas.

Questão 18

Entre as leucemias agudas, qual a que, com maior frequência, cursa com CIVD?

- A) Linfoblástica.
- B) Promielocítica.
- C) Monocítica pura.
- D) Mielomonocítica.

Questão 19

O tratamento inicial para os portadores de púrpura trombocitopênica imunológica é

- A) globulina anti-timócitos.
- B) corticóide.
- C) esplenectomia.
- D) quimioterapia.

Questão 20

Qual das condições **não** se associa com anemia hemolítica auto-imune?

- A) Pneumonia por mycoplasma.
- B) Linfadenopatia angioimunoblástica.
- C) Pericardite.
- D) Lupus eritematoso sistêmico.

Questão 21

Sobre talassemia, podemos afirmar:

- A) o ferro sérico está baixo.
- B) cursa com hemólise auto-imune.
- C) é conhecida como anemia do Mediterrâneo.
- D) é um defeito na membrana da hemácia.

Questão 22

Paciente do sexo masculino, 76 anos, com adenopatias e hepatoesplenomegalia, apresenta gamopatia monoclonal tipo IgM. O provável diagnóstico é

- A) doença de cadeia pesada gama.
- B) mieloma múltiplo.
- C) doença de Waldenström.
- D) doença de Hodgkin.

Questão 23

Em relação à metaplasia mielóide, qual a opção **incorreta**?

- A) Apresenta o PH₁ 22 em 85% dos casos.
- B) Esplenomegalia é comum.
- C) Pode ser secundária a carcinomas.
- D) Hemograma leucoeritroblástico é freqüente.

Questão 24

Na esferocitose hereditária, **não** encontramos

- A) microesferócitos.
- B) haptoglobina elevada.
- C) reticulocitose.
- D) ferro sérico alto.

Questão 25

Em relação à leucemia linfóide crônica, é **correto** afirmar que

- A) encontramos leucocitose com desvio à esquerda.
- B) o PH₁ 22 é positivo.
- C) lesões osteolíticas são freqüentes.
- D) é uma doença de linfócito "B", na maioria dos casos.

Questão 26

Sobre a doença de Hodgkin (esclerose-nodular), é **correto** afirmar que

- A) é freqüente em mulheres jovens.
- B) o acometimento mediastinal é raro.
- C) o prognóstico é péssimo.
- D) é regra a infiltração da medula óssea.

Questão 27

Paciente de 15 anos, com sangramentos de mucosas e equimoses, apresenta PTT alargado, contagem de plaquetas normal, retração do coágulo completa e tempo de sangria de 10 minutos. O diagnóstico provável é

- A) aplasia medular.
- B) hemofilia "A".
- C) tromboastenia de Glanzmann.
- D) doença de Von Willebrand.

Questão 28

O principal fator responsável pela lesão renal no mieloma múltiplo (rim do mieloma) é o(a)

- A) proteinúria de Bence-Jones.
- B) cálcio.
- C) ácido úrico.
- D) amiloidose.

Questão 29

É(são) um achado raro na policitemia vera:

- A) pletora.
- B) úlcera péptica.
- C) anemia.
- D) tromboflebites.

Questão 30

É um fator de **mal** prognóstico na leucemia aguda linfoblástica:

- A) leucopenia.
- B) lesão inicial do SNC.
- C) criança com 6 anos de idade.
- D) estado geral preservado.

Questão 31

A parasitose intestinal associada com carência de vitamina B12 é

- A) *diphilobotrium latum*.
- B) ancilostomíase.
- C) amebíase.
- D) ascaridíase.

Questão 32

Consideramos **mal** prognóstico na doença de Hodgkin:

- A) prurido intenso.
- B) febre.
- C) sudorese noturna.
- D) perda de peso.

Questão 33

Nas síndromes mielodisplásicas, **não** encontramos

- A) anemia.
- B) poliglobulia.
- C) trombocitopenia.
- D) leucócitos normais.

Questão 34

O achado mais importante no sangue periférico dos portadores de hemoglobinopatia "C" é(são)

- A) macrocitose.
- B) hipocromia.
- C) hemácias em alvo.
- D) policromasia.

Questão 35

A escola de Stanford preconiza, como tratamento da doença de Hodgkin em fase inicial (estágios I e II), a

- A) quimioterapia e a radioterapia.
- B) quimioterapia.
- C) imunoterapia.
- D) radioterapia isolada.

Questão 36

A sobrevida média de um granulócito neutrófilo é

- A) 7 a 10 dias.
- B) 7 a 10 meses.
- C) 7 a 10 horas.
- D) 7 a 10 semanas.

Questão 37

Na anemia aplástica congênita infantil (Fanconi), **não** encontramos

- A) rins ectópicos.
- B) leucocitose.
- C) hemoglobina fetal elevada.
- D) hiperpigmentação cutânea.

Questão 38

A condição **não** associada à coagulação intravascular disseminada é

- A) feto morto retido.
- B) citomegalovirose.
- C) sépsis.
- D) carcinoma de próstata.

Questão 39

Em relação ao linfoma de Burkitt, é **incorreto** afirmar que

- A) apresenta lesões em mandíbulas e maxilas.
- B) está associado ao EBV.
- C) apresenta aspecto em céu estrelado.
- D) acomete idosos.

Questão 40

A púrpura trombocitopênica imunológica **não é** causada por

- A) virose.
- B) leucemia linfóide crônica.
- C) pneumonia bacteriana.
- D) lúpus.