

PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

Concurso Público

Aplicação: 17/08/2003

CARGO:

MÉDICO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - 130

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno é constituído de 40 questões assim distribuídas: Conhecimentos Gerais, de 01 a 12; e Conhecimentos Específicos, de 13 a 40.
2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis.
3. Cada questão contém quatro opções de resposta, sendo apenas uma a correta.
4. A duração da prova é de quatro horas.
5. Terminada a prova, o candidato entregará a folha de respostas e o caderno de questões ao fiscal.
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas instruções ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

Nº INSCRIÇÃO _____

Questão 01

No que se refere ao prontuário médico, é **correto** afirmar que

- A) o paciente, em caso de erro médico, só pode ter acesso ao seu prontuário sob ordem judicial.
- B) é permitido ao médico negar acesso ao paciente a seu prontuário, ficha clínica ou similar.
- C) o paciente não pode manusear o prontuário, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional.
- D) é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente.

Questão 02

Avalie as afirmações abaixo, que se referem à relação do médico com o paciente.

- 1 - É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa causa.
- 2 - É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou seu representante legal.
- 3 - É dever do médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento.

Estão **corretas** as seguintes afirmações:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 3.

Questão 03

Sobre os modelos assistenciais, é **incorreto** afirmar que

- A) o modelo sanitista tem enfrentado os problemas de saúde da população por meio de campanhas e programas especiais.
- B) o modelo sanitista e o modelo médico-assistencial privatista coexistem de forma contraditória ou complementar no Brasil.
- C) o modelo assistencial privatista está voltado fundamentalmente para a chamada demanda espontânea.
- D) o modelo médico-assistencial privatista é o menos prestigiado, embora contemple o conjunto de problemas de saúde da população brasileira.

Questão 04

Sobre o atestado médico, é **correto** afirmar que

- A) é obrigatória a citação do CID em todos os casos.
- B) é direito inquestionável do paciente.
- C) pode importar em majoração de honorários profissionais
- D) é procedimento legal para angariar clientela.

Questão 05

Sobre a mistanásia, é **correto** afirmar que

- A) é o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente.
- B) é a morte miserável fora e antes do seu tempo.
- C) guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente.
- D) visa propiciar a morte sem dor.

Questão 06

Quanto ao erro médico, é **correto** afirmar:

- A) justifica-se em casos de excesso de trabalho e conseqüente desgaste profissional.
- B) a instituição fica isenta de culpa, quando há grande sobrecarga de atendimentos.
- C) o médico que se omitiu em um atendimento é penalizado, sendo considerado imprudente.
- D) em caso de excesso de trabalho, o médico e a instituição serão responsabilizados.

Questão 07

É **correto** afirmar que surto epidêmico

- A) tem rápida progressão até atingir a incidência máxima num intervalo de tempo.
- B) é o aumento do número total de casos, superando o valor endêmico.
- C) é a ocorrência de uma série de epidemias.
- D) tem ocorrência epidêmica restrita a espaço delimitado.

Questão 08

Em caso de acidente biológico, é **correto** afirmar que

- A) o risco de aquisição do vírus da hepatite B, em paciente não imunizado, de fonte positiva é inúmeras vezes mais freqüente que o HIV de fonte positiva.
- B) as práticas de biossegurança em manipulação de pacientes considerados grupos de risco devem ser amplas e distintas do restante.
- C) o primeiro procedimento será pesquisar sorologias positivas no prontuário do paciente.
- D) a prescrição de um único anti-retroviral é aconselhável, pelos efeitos colaterais das drogas.

Questão 09

Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a conduta imediata **mais correta** será

- A) lavar com PVPI degermante e, a seguir, usar o PVPI tópico.
- B) lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido.
- C) lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar anti-séptico.
- D) fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão.

Questão 10

A infecção hospitalar se manifesta

- A) após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos invasivos.
- B) durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou procedimento.
- C) obrigatoriamente após procedimentos invasivos realizados no hospital em questão.
- D) sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas.

Questão 11

Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-negativos e cultura de secreção abdominal positiva para *Proteus mirabilis*, a **melhor** opção terapêutica é

- A) amicacina e metronidazol.
- B) oxacilina e metronidazol.
- C) clindamicina e fluconazol.
- D) cefotaxima e amicacina.

Questão 12

Em relação à vigilância sanitária, é **correto** afirmar que

- A) é um conjunto de medidas que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias.
- B) a vigilância sanitária atua sobre os fatores de risco à saúde, porém sem ação normativa sobre a industrialização e armazenamento.
- C) não tem atuação sobre ações de normatização e controle do meio ambiente.
- D) é um conjunto de normatizações sobre a prestação de serviços e atividades, independente da relação com a saúde.

Questão 13

O diafragma pélvico é a denominação do conjunto anatômico formado pelos seguintes músculos:

- A) músculo puboretal e músculo coccígeo.
- B) músculos elevadores do ânus, transverso superficial do períneo.
- C) músculo puboretal, pubococcígeo e esfíncter estriado da uretra.
- D) músculos elevadores do ânus, músculo coccígeo.

Questão 14

O ciclo menstrual é o resultado da interação dinâmica entre hipotálamo-hipófise e ovário. Assinale a opção **correta**.

- A) O principal agente luteotrófico é o FSH, que é secretado de forma episódica, determinando a secreção da progesterona.
- B) O Sistema Nervoso Central exerce controle na secreção das gonadotrofinas, mediado pela produção e liberação do GH.
- C) O processo de seleção folicular para o ciclo vigente ocorre por volta do 12º dia do ciclo menstrual, em um ciclo de 28 dias.
- D) O folículo dominante atinge a produção máxima de estrógeno entre 24 e 36 horas antes da ovulação.

Questão 15

O sangramento uterino disfuncional (SUD) é uma desordem que pode ocorrer em qualquer fase da vida reprodutiva. Assinale a opção **correta**.

- A) A histeroscopia diagnóstica é um exame de grande valor em SUD, principalmente se a paciente é portadora de mioma subseroso.
- B) Mulheres com SUD têm perda sanguínea de grande volume, podendo levar ao choque hipovolêmico.
- C) A avaliação histológica do endométrio tem indicação em pacientes com idade acima de 40 anos e com SUD.
- D) O uso de estrógenos conjugados não deve ser preconizado no SUD, porque o sangramento pode ser devido a uma causa anovulatória, com conseqüente aumento dos estrógenos circulantes.

Questão 16

A amenorréia primária é definida com a ausência de menarca. Assinale a opção **correta**.

- A) Os ovários policísticos podem ser causa de amenorréia primária.
- B) Após tratamento adequado, 50% das mulheres portadoras de disgenesia gonádica somática típica também denominada síndrome de Turner, podem apresentar ciclos menstruais normais.
- C) Na síndrome de Morrisk, ocorre desenvolvimento normal dos testículos, com isso, a paciente não apresenta vagina.
- D) A criptomenorréia é a ausência de menstruação devido à agenesia dos ovários.

Questão 17

A puberdade conduz o organismo a um estado de maturação física e psíquica. Assinale a opção **incorreta**.

- A) A puberdade precoce é definida como o aparecimento de caracteres sexuais secundários entre 8 e 10 anos.
- B) A hiperplasia congênita da supra-renal consiste em uma alteração da bioesteroidogênese adrenal devido à deficiência da enzima 21 hidroxilase (mais freqüente).
- C) O uso prolongado de creme contendo estrógenos no tratamento da coalescência dos pequenos lábios pode levar a um desenvolvimento mamário e desencadear sangramento genital.
- D) Considera-se puberdade tardia a permanência de caracteres físicos pré-púberes em pacientes do sexo feminino, aos 13 anos de idade.

Questão 18

Com relação às alterações que ocorrem na mulher climatérica, assinale a opção **incorreta**.

- A) A falência ovariana prematura é definida como a cessação da menstruação antes dos 40 anos.
- B) A estrona predominante na pós-menopausa deriva principalmente do metabolismo da testosterona produzida na supra-renal.
- C) Segundo a OMS, mulheres brancas, com densidade mineral óssea abaixo de -2,5 desvios padrões, podem ser classificadas como portadores de osteoporose.
- D) A atresia folicular ocorre, nos fetos femininos, desde a vida intra-uterina.

Questão 19

Os sintomas associados à vaginite são corrimento vaginal, prurido e, às vezes, reação inflamatória. Assinale a opção **correta**.

- A) A *Gardnerellose vaginalis* é a causa infreqüente de vaginose em mulher na idade fértil.
- B) As culturas para fungos e bactérias causadores de vulvovaginites geralmente são desnecessárias como rotina na prática clínica.
- C) Nas mulheres, a tricomoníase é sempre sintomática.
- D) A maioria dos estudos conclui que, na candidíase vaginal, é imprescindível o tratamento do parceiro para obtermos a redução dos episódios recorrentes.

Questão 20

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) englobam uma série de doenças infecciosas causadas por vírus, fungos, protozoários ou bactérias cuja via preferencial de transmissão é a sexual. Assinale a opção **correta**.

- A) A melhor maneira de se fazer o diagnóstico de sífilis em atividade é por meio do VDRL ou FTA-Abs.
- B) A Síndrome de Fitz-Hugh e Curtis é uma peri-hepatite causada exclusivamente pela *Neisseria gonorrhoeae*.
- C) A maioria das infecções causadas pela *Chlamidia trachomatis* é assintomática e acomete em maior número as pacientes jovens.
- D) O objetivo do tratamento do condiloma acuminado é que removendo a lesão consegue-se a erradicação do HPV.

Questão 21

A doença inflamatória pélvica (DIP) é de grande importância social devido principalmente ao comprometimento do futuro reprodutor. Analisando esse dado, assinale a opção **correta**.

- A) Pacientes portadoras de abscesso tubo ovariano devem ser submetidas à drenagem do abscesso, qualquer que seja o seu volume.
- B) Na fase progesterônica do ciclo menstrual, há facilitação da ascensão de bactérias da vagina para a cavidade endometrial.
- C) A mucosa vaginal trófica é resistente a infecções por *Chlamídia trachomatis* e gonococos.
- D) As duchas vaginais diminuem a flora vaginal e, com isso, podem diminuir a incidência da DIP.

Questão 22

Quanto às distopias genitais, é **correto** afirmar:

- A) na enterocele, o tratamento preferencial consiste na realização da cirurgia de Le Fort (colpocleise).
- B) a cistocele é resultante da flacidez do diagrama pélvico.
- C) classifica-se o prolapso uterino como do 2º grau, quando o colo do útero ultrapassa a fenda vulvar.
- D) os ligamentos redondos constituem os principais ligamentos de sustentação do útero.

Questão 23

Qual dos fatores de risco **não** se relaciona à gênese do carcinoma epidermóide do colo uterino?

- A) Álcool.
- B) Tabagismo.
- C) Início precoce da atividade sexual.
- D) HPV.

Questão 24

Sobre o leiomioma uterino, é **correto** afirmar:

- A) é mais freqüente em mulheres brancas.
- B) está relacionado com a produção de estrógenos e depende da existência de receptores para estradiol no miométrio.
- C) mulheres com leiomiomas não devem usar anticoncepcionais orais combinados, pois eles levam com freqüência a um aumento desse problema.
- D) a degeneração sarcomatosa do mioma uterino é freqüente na pós-menopausa.

Questão 25

Quanto aos anticoncepcionais orais, apenas uma opção é **incorreta**.

- A) As pacientes jovens com diabete mellitus tipo I (insulinodependente) podem usar pílula anticoncepcional, porém devem ser alertadas da provável necessidade do aumento da dose de insulina.
- B) O emprego de anticoncepcional combinado pode determinar amenorréia.
- C) A ausência de fluxo de privação ao término de uma série de comprimidos anticoncepcionais pode indicar uma gravidez.
- D) Os anticoncepcionais orais exercem seus efeitos por meio da inibição do pico das gonadotrofinas do meio do ciclo, impedindo a ovulação.

Questão 26

Em relação ao método de contracepção de emergência, podemos afirmar:

- A) o uso do método é de caráter excepcional e deve ser orientado até 72 horas após a relação sexual desprotegida.
- B) na anticoncepção de emergência é contra-indicado o uso do DIU de cobre.
- C) ocorrendo condições favoráveis à implantação do blastocisto, esta ocorrerá em torno de 72 horas após a ovulação. Daí a eficácia da contracepção de emergência ser maior quando usada até 72 horas pós-coito.
- D) o regime de Yuzpe consiste na administração de 200mg de etinilestradiol + 200 mg de levonorgestrel, divididos em duas tomadas.

Questão 27

Qual a linha de orientação na apresentação cefálica defletida do II grau?

- A) Linha facial.
- B) Sutura sagital.
- C) Sutura ságito-metópica.
- D) Sutura metópica.

Questão 28

No caso de apresentação pélvica em período expulsivo-cabeça derradeira, qual a conduta adequada?

- A) Extração do pólo cefálico com fórceps de Piper.
- B) Extração do pólo cefálico com fórceps de Simpson.
- C) Cesareana.
- D) Manobra de Jacobs.

Questão 29

O diagnóstico de anemia ferropriva na gestante é feito basicamente pela

- A) hemograma completo e hemoglobina corpuscular.
- B) número de hemácias e leucócitos.
- C) dosagem de hemoglobina e valor do volume corpuscular médio.
- D) eletroforese de hemoglobina e proteínas.

Questão 30

A maioria das modificações cardiovasculares na gravidez, acontece

- A) no 3º trimestre.
- B) no 1º trimestre.
- C) no final da gestação.
- D) no quarto período do parto.

Questão 31

A taxa de uréia na gestante normal é até

- A) 20mg.
- B) 30mg.
- C) 35mg.
- D) 40mg.

Questão 32

Consideram-se fatores de risco para a pré-eclampsia:

- A) primigesta; gestação gemelar e hipertensão arterial crônica.
- B) secundigesta, mesmo parceiro e gestação gemelar.
- C) tercigesta; gestação única e mudança de parceiro.
- D) gestação única, mesmo parceiro e hipertensão arterial crônica.

Questão 33

É um sinal claro de ocorrência do início de trabalho de parto em gestação a termo a(as)

- A) dilatação cervical.
- B) ruptura de membranas amnióticas.
- C) contrações uterinas.
- D) perda do tampão mucoso.

Questão 34

São sinais de iminência de rotura uterina:

- A) paralisação do trabalho de parto.
- B) dor abrupta e lancinante no hipogástrico.
- C) pacientes com contrações subentrantes intensas e excessivamente dolorosas e síndrome de distensão segmentar.
- D) distensão segmentar com deformidade abdominal e paralisação do trabalho de parto.

Questão 35

O início do 2º período do parto é marcado pelos seguintes sintomas:

- A) dilatação completa e puxo voluntário.
- B) retração do útero, aumento de circulação placentária e taquicardia fetal.
- C) grande sangramento vaginal.
- D) a mulher sente puxos involuntários, porque o saco amniótico ou a apresentação protui através do colo dilatado, pressionando o reto.

Questão 36

Sintomas iniciais podem dificultar o diagnóstico de DPP (deslocamento prematuro da placenta) e devem ser valorizados. Esses sintomas são

- A) bradicardia fetal e sangramento vaginal.
- B) dor abdominal e bradicardia fetal.
- C) taquissístolia e dor abdominal discreta.
- D) sangramento vaginal e hipertensão.

Questão 37

Nas gestações, diferentes patologias podem levar ao edema agudo de pulmão. As causas mais comuns desse edema na gravidez são

- A) varizes e vida sedentária.
- B) uso de beta adrenérgicos com abuso de infusão ou sobrecarga hídrica.
- C) infecções agudas do aparelho respiratório.
- D) cetoacidose diabética e sobrecarga hídrica.

Questão 38

Infecção urinária é o problema urinário mais comum durante a gestação. O quadro clínico característico

- A) é febre e polaciúria.
- B) varia de bacteriúria assintomática até o quadro de pielonefrite.
- C) é dor na região lombar e febre.
- D) apresenta contrações uterinas e polaciúria.

Questão 39

O diabetes gestacional é definido como

- A) doença metabólica apresentando apenas tolerância diminuída à glicose.
- B) doença metabólica crônica responsável por malformação fetal com restrição do crescimento fetal.
- C) intolerância aos carboidratos com restrição do crescimento fetal.
- D) intolerância aos carboidratos, de graus variados de intensidade, diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto.

Questão 40

A avaliação da vitalidade fetal pode ser feita por meio dos seguintes métodos clínicos:

- A) perfil biofísico fetal.
- B) cardiotocografia.
- C) registro diário de movimentação fetal e prova de aceleração cardíaca fetal.
- D) cardiotocografia e prova de aceleração cardíaca fetal.

