

# PRÓ REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

## Concurso Público

Aplicação: 17/08/2003

### CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGIA - 132

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

1. Este caderno é constituído de 40 questões assim distribuídas: Conhecimentos Gerais, de 01 a 12; e Conhecimentos Específicos, de 13 a 40.
2. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis.
3. Cada questão contém quatro opções de resposta, sendo apenas uma a correta.
4. A duração da prova é de quatro horas.
5. Terminada a prova, o candidato entregará a folha de respostas e o caderno de questões ao fiscal.
6. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nestas instruções ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

Nº INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_



---

### Questão 01

No que se refere ao prontuário médico, é **correto** afirmar que

- A) o paciente, em caso de erro médico, só pode ter acesso ao seu prontuário sob ordem judicial.
- B) é permitido ao médico negar acesso ao paciente a seu prontuário, ficha clínica ou similar.
- C) o paciente não pode manusear o prontuário, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional.
- D) é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário para cada paciente.

### Questão 02

Avalie as afirmações abaixo, que se referem à relação do médico com o paciente.

- 1 - É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa causa.
- 2 - É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou seu representante legal.
- 3 - É dever do médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento.

Estão **corretas** as seguintes afirmações:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 1, 2 e 3.

### Questão 03

Sobre os modelos assistenciais, é **incorreto** afirmar que

- A) o modelo sanitário tem enfrentado os problemas de saúde da população por meio de campanhas e programas especiais.
- B) o modelo sanitário e o modelo médico-assistencial privatista coexistem de forma contraditória ou complementar no Brasil.
- C) o modelo assistencial privatista está voltado fundamentalmente para a chamada demanda espontânea.
- D) o modelo médico-assistencial privatista é o menos prestigiado, embora contemple o conjunto de problemas de saúde da população brasileira.

### Questão 04

Sobre o atestado médico, é **correto** afirmar que

- A) é obrigatória a citação do CID em todos os casos.
- B) é direito inquestionável do paciente.
- C) pode importar em majoração de honorários profissionais
- D) é procedimento legal para angariar clientela.

---

### Questão 05

Sobre a mistanásia, é **correto** afirmar que

- A) é o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente.
- B) é a morte miserável fora e antes do seu tempo.
- C) guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente.
- D) visa propiciar a morte sem dor.

### Questão 06

Quanto ao erro médico, é **correto** afirmar:

- A) justifica-se em casos de excesso de trabalho e conseqüente desgaste profissional.
- B) a instituição fica isenta de culpa, quando há grande sobrecarga de atendimentos.
- C) o médico que se omitiu em um atendimento é penalizado, sendo considerado imprudente.
- D) em caso de excesso de trabalho, o médico e a instituição serão responsabilizados.

### Questão 07

É **correto** afirmar que surto epidêmico

- A) tem rápida progressão até atingir a incidência máxima num intervalo de tempo.
- B) é o aumento do número total de casos, superando o valor endêmico.
- C) é a ocorrência de uma série de epidemias.
- D) tem ocorrência epidêmica restrita a espaço delimitado.

### Questão 08

Em caso de acidente biológico, é **correto** afirmar que

- A) o risco de aquisição do vírus da hepatite B, em paciente não imunizado, de fonte positiva é inúmeras vezes mais freqüente que o HIV de fonte positiva.
- B) as práticas de biossegurança em manipulação de pacientes considerados grupos de risco devem ser amplas e distintas do restante.
- C) o primeiro procedimento será pesquisar sorologias positivas no prontuário do paciente.
- D) a prescrição de um único anti-retroviral é aconselhável, pelos efeitos colaterais das drogas.

### Questão 09

Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a conduta imediata **mais correta** será

- A) lavar com PVPI degermante e, a seguir, usar o PVPI tópico.
- B) lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido.
- C) lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar anti-séptico.
- D) fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão.

---

### Questão 10

A infecção hospitalar se manifesta

- A) após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos invasivos.
- B) durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou procedimento
- C) obrigatoriamente após procedimentos invasivos realizados no hospital em questão.
- D) sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas.

### Questão 11

Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-negativos e cultura de secreção abdominal positiva para *Proteus mirabilis*, a **melhor** opção terapêutica é

- A) amicacina e metronidazol.
- B) oxacilina e metronidazol.
- C) clindamicina e fluconazol.
- D) cefotaxima e amicacina.

### Questão 12

Em relação à vigilância sanitária, é **correto** afirmar que

- A) é um conjunto de medidas que visa elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias.
- B) a vigilância sanitária atua sobre os fatores de risco à saúde, porém sem ação normativa sobre a industrialização e armazenamento.
- C) não tem atuação sobre ações de normatização e controle do meio ambiente.
- D) é um conjunto de normatizações sobre a prestação de serviços e atividades, independente da relação com a saúde.

### Questão 13

Sobre a síndrome de Duane, é **incorreto** afirmar:

- A) no tipo I, há esodesvio e limitação à abdução.
- B) geralmente se associa à posição de cabeça significante.
- C) quando há posição de cabeça de desvio em posição primária significante, há indicação de intervenção cirúrgica.
- D) todos os tipos têm em comum a limitação à abdução.

---

**Questão 14**

A principal causa de paralisia do nervo oculomotor em adultos é

- A) tumoral.
- B) traumática.
- C) inflamatória.
- D) microvascular.

**Questão 15**

A lei de Hering é violada em

- A) ET congênito.
- B) síndrome de Brown.
- C) desvio vertical dissociado.
- D) esotropia cíclica.

**Questão 16**

Ao usar prismas para diagnóstico de estrabismo, qual teste quantifica somente a tropia?

- A) Teste cover simultâneo.
- B) Cover-uncover.
- C) Teste Maddox.
- D) Teste cover alternado.

**Questão 17**

Sobre o desvio convergente (ET infantil), é **incorreto** afirmar que

- A) se tem a dupla ressecção dos retos laterais como uma alternativa cirúrgica.
- B) pode haver hiperfunção dos oblíquos inferiores.
- C) há alta relação acomodação/convergência.
- D) há nistagno latente.

**Questão 18**

Com relação aos mióticos, assinale a opção **incorreta**.

- A) Promovem a contração do músculo longitudinal do corpo ciliar, o que determina tração do esporão escleral e abertura da malha trabecular.
- B) Têm função parassimpático-mimética.
- C) São potenciais indutores de estenose de ponto lacrimal, catarata e descolamento de retina.
- D) São totalmente contra-indicados nos casos de glaucoma neovascular e glaucoma maligno.

---

### Questão 19

A trabeculoplastia é uma ótima opção em alguns tipos de glaucoma, como terapêutica inicial e/ou coadjuvante no tratamento clínico tópico, além de poder retardar uma indicação cirúrgica. Sobre essa terapêutica, é **incorreto** afirmar:

- A) tem boa resposta no glaucoma pseudo-esfoliativo e no glaucoma primário de ângulo aberto.
- B) indivíduos jovens mostram melhor resultado.
- C) deve ser realizada na transição trabeculado não pigmentado-pigmentado.
- D) pode provocar queimaduras corneanas e sinéquias anteriores periféricas

### Questão 20

No 1º dia de pós-operatório de uma cirurgia filtrante, o paciente queixa-se de dor. No exame clínico, o médico assistente observa bolha pouco elevada, câmara anterior plana e pouco profunda e pressão de 35mmHg. Nas opções abaixo, qual o diagnóstico **incorreto**?

- A) Hemorragia supracoroidal.
- B) Bloqueio pupilar.
- C) Efusão ciliocoroidal.
- D) Inversão na direção do escoamento do aquoso.

### Questão 21

Qual defeito campimétrico é mais esperado no glaucoma?

- A) Hemianopsia bitemporal.
- B) Defeito de hemicampo superior.
- C) Escotoma paracentral.
- D) Defeito de hemicampo inferior.

### Questão 22

Sobre o glaucoma relacionado ao cristalino, é **incorreto** afirmar:

- A) no glaucoma facolítico, há obstrução do trabeculado por proteínas de alto peso molecular derivadas de um cristalino com catarata hipermadura e cápsula íntegra.
- B) no glaucoma facoanafilático, a cápsula anterior do cristalino está rota.
- C) no tratamento do GL facomórfico, indica-se uma trabeculectomia de urgência.
- D) no glaucoma facomórfico, há bloqueio pupilar e fechamento angular secundário.

---

### Questão 23

São exames essenciais para o mecanismo de proteção corneana no pré-operatório de uma cirurgia de ptose, **exceto** o(a)

- A) avaliação do fenômeno de Bell.
- B) medida da distância margem-reflexo.
- C) teste de Schimmer.
- D) avaliação da sensibilidade corneana.

### Questão 24

Na ptose secundária à cirurgia de catarata, com boa função do músculo elevador da pálpebra superior, o procedimento de escolha é

- A) ressecção do músculo de Muller.
- B) reinserção da aponeurose do elevador.
- C) ressecção do músculo elevador da pálpebra superior.
- D) suspensão ao músculo frontal.

### Questão 25

Blefarofimose é geralmente associada às condições abaixo, **exceto**

- A) ptose.
- B) epicanto.
- C) ectrópio.
- D) distiquíase.

### Questão 26

Com relação à etiologia do entrópio senil, é **incorreto** atribuí-la à(ao)

- A) encurtamento da lamela anterior.
- B) frouxidão horizontal da pálpebra.
- C) frouxidão dos retratores da pálpebra inferior.
- D) enoftalmo senil.

### Questão 27

Com relação à obstrução congênita das vias lacrimais, é **incorreto** afirmar que a

- A) resolução espontânea ocorre, em média, entre 9-12 meses de idade.
- B) obstrução canalicular é o sítio mais freqüente.
- C) entubação com silastic deve ser tentada previamente à dacriocistorinostomia.
- D) resolução espontânea é rara após a idade de 1 ano.



---

**Questão 28**

A conexão sináptica **correta** é

- A) plexiforme interna – bipolar e células ganglionares.
- B) plexiforme externa – bipolar e células ganglionares.
- C) plexiforme externa – fotoreceptores e células ganglionares.
- D) plexiforme interna – fotoreceptores e células ganglionares.

**Questão 29**

Aumentam a penetração de drogas na córnea, **exceto**

- A) altas concentrações.
- B) pH alto.
- C) alta solubilidade lipídica.
- D) adição de cloreto de benzalcônio.

**Questão 30**

Quais estruturas passam pelas fissuras orbitárias inferiores?

- A) Nervos infraorbitais.
- B) Nervos infraorbitais e fibras pós-ganglionares das glândulas lacrimais (derivadas do gânglio pterigopalatino).
- C) Veias oftálmicas.
- D) Fibras pós-ganglionares das glândulas lacrimais (derivadas do gânglio pterigopalatino).

**Questão 31**

Sobre as lesões do trato óptico, a associação **incorreta** é o(a)

- A) perda total de campo visual de um olho.
- B) defeito pupilar aferente contralateral.
- C) hemianopsia homônima.
- D) defeito pupilar aferente ipsilateral.

**Questão 32**

A filtração do humor aquoso dá-se principalmente por

- A) trabeculado pigmentado.
- B) via córneo-escleral.
- C) trabeculado não pigmentado.
- D) via uveal.

---

### Questão 33

Assinale a afirmativa **correta**.

- A) As fibrilas de colágeno que compõem a córnea possuem um arranjo que as deixam muito afastadas umas das outras, com grandes espaços interlamelares para que possam deixar passar a luz.
- B) Os proteoglicanos são os responsáveis pela manutenção de um espaço uniforme entre as fibrilas de colágeno corneano, permitindo um arranjo paralelo transparente à luz.
- C) Os glicosaminoglicanos são moléculas hidrofóbicas e não têm papel importante na desidratação corneana.
- D) A esclera é opaca por possuir uma rede colágeno mais organizada, impedindo desse modo a passagem da luz.

### Questão 34

Sobre as células endoteliais, é **correto** afirmar:

- A) a população de células endoteliais cresce progressivamente com a idade, chegando a atingir 4.000 células por  $\text{mm}^2$  aos 70 anos.
- B) o transplante de córnea não complicado não modifica a contagem de células endoteliais do doador.
- C) dos 20 aos 50 anos, a população endotelial se mantém estável, por volta de 2.000 a 3.500 células por  $\text{mm}^2$ .
- D) o estudo das variações de tamanho das células endoteliais é chamado de pleomorfismo.

### Questão 35

Sobre o ceratocone, é **correto** afirmar:

- A) o ceratocone agudo ou hidropsia sempre se constitui em um dos raros casos de necessidade de transplante de córnea em caráter de emergência.
- B) os depósitos de ferro no epitélio, na base do cone, formam estrias finas no epitélio chamadas de estrias de Vogt.
- C) a perfuração espontânea no ceratocone é extremamente comum, devendo ter-se especial cuidado na síndrome de Ehler-Danlos.
- D) um dos sinais patognomônicos do ceratocone é a deformação cônica da pálpebra na infraversão, chamada de sinal de Munson.

---

### Questão 36

Assinale a opção **correta**.

- A) As úlceras micóticas causadas por fungos leveduriformes são as mais freqüentes nos climas quentes e pós-trauma.
- B) O uso de corticosteroides tópicos millesimais é extremamente útil na ceratite herpética dendrítica, substituindo e tornando dispensável o uso de anti-virais tópicos.
- C) O tratamento da ceratite herpética dendrítica consiste em debridamento epitelial e uso tópico de anti-virais.
- D) O pterígio caracteriza-se por massa fibro-vascular triangular elevada crescendo em direção à córnea a partir da conjuntiva bulbar. Não tem relação com radiação ultra-violeta e sua remoção é simples e raramente apresenta recidiva.

### Questão 37

Em pacientes com endoftalmite pós-facectomia e acuidade visual de percepção luminosa, a **melhor** conduta comprovada na literatura é

- A) aspirar conteúdo da câmara anterior para cultura e antibiograma e injetar antibiótico intra-ocular e antibiótico sistêmico.
- B) aspirar conteúdo do humor vítreo para cultura e antibiograma, realizar vitrectomia e injetar antibiótico intra-ocular.
- C) aspirar conteúdo do humor vítreo para cultura e antibiograma, injetar antibiótico intra-ocular e indicar vitrectomia se não houver boa evolução clínica em 3 dias.
- D) aspirar conteúdo do humor vítreo para cultura e antibiograma e injetar antibiótico intra-ocular e antibiótico sistêmico.

### Questão 38

Na ecografia tipo B do globo ocular, é **incorreto** afirmar:

- A) o espessamento de coróide pode ser de alta ou baixa reflectividade dependendo de sua etiologia.
- B) em situações especiais (essencialmente inflamação e trauma), somente a ressonância nuclear magnética pode auxiliar o diagnóstico diferencial entre deslocamento de retina e deslocamento posterior do vítreo.
- C) o espessamento escleral pode ser detectado em olhos normais e, na esclerite posterior, pode mostrar espessamento tipicamente da esclera posterior.
- D) no melanoma de coróide, encontramos consistência sólida, baixa e média reflectividade, vascularização interna e estrutura interna regular.

---

**Questão 39**

Quanto ao eletroretinograma, é **incorreto** afirmar:

- A) o ERG fotópico pode ser normal após secção traumática do nervo óptico.
- B) o ERG fotópico em descolamento de retina é reduzido em amplitude, proporcional à área de descolamento e ter a forma do comprimento de onda normal.
- C) as doenças que envolvem os receptores estão geralmente associadas com a redução parcial ou total de amplitude do ERG.
- D) na retinopatia diabética, a onda B está preservada e a onda A sempre abolida.

**Questão 40**

Os fatores mais importantes na etiopatogenia do deslocamento do vítreo são

- A) liquefação e pregueamento da membrana limitante interna.
- B) movimentos bruscos e gravidade.
- C) liquefação e retração das fibras colágenas.
- D) senilidade e hemorragia vítrea.

