

**RESIDÊNCIA MÉDICA 2014**

Cirurgia do Aparelho Digestivo

Cirurgia videolaparoscópica

**Urologia**

*(Questões teórico-práticas)*

**Leia estas instruções:**

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso.
- 2 Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo.
- 3 Este Caderno contém 5 casos clínicos e suas respectivas questões. Verifique se ele está completo e sem imperfeição gráfica que impeça a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 O valor total de cada caso clínico vem indicado na própria questão.
- 5 Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
- 6 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.
- 7 O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
- 8 Você dispõe de, no máximo, três horas para responder as questões.
- 9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva este Caderno ao Fiscal.

**Assinatura do Candidato:** \_\_\_\_\_

**Caso Clínico 1** (2 pontos)

Um paciente é submetido à colecistectomia convencional por colecistite aguda com intenso processo inflamatório. Ao iniciar a dissecação pelo triângulo de Callot, depois de algum tempo, você percebe que houve transecção do ducto hepático comum. Diante desse quadro, responda:

- A)** Qual a melhor conduta para tratar a lesão?
- B)** Quais as três principais complicações que esse paciente poderá ter.
- C)** Quais as duas medidas que poderiam evitar a referida lesão.

---

Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

**Caso Clínico 2** (2 pontos)

Um paciente com hérnia inguino-escrotal foi submetido à herniorrafia inguinal esquerda. No terceiro dia do pós-operatório, apresenta dor de forte intensidade e edema na bolsa escrotal. Diante desse quadro, responda:

- A)** Qual a provável complicação decorrente desse caso?
- B)** Qual o tratamento adequado para esse paciente?
- C)** Cite dois procedimentos cirúrgicos que podem evitar essa complicação.

---

Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

---

### **Caso Clínico 3** (2 pontos)

Um paciente de 67 anos de idade procura o ambulatório de um pronto socorro para obter uma segunda opinião sobre sua doença. Ele não tem sintomas urinários. É hipertenso, diabético e tem hipercolesterolemia, controlada com uso diário de medicamentos orais. Faz uso de inibidor de fosfodiesterase-5 há um ano, 4 vezes por semana, com boa resposta. Está casado pela segunda vez e tem três filhos. É o mais velho de 4 irmãos. Os pais morreram de doença cardiovascular na sétima década de vida. Habitado a fazer exames de rotina e preventivos, o paciente procurou um médico e foi constatada a seguinte situação:

*O toque retal mostrava uma próstata aumentada de volume, sem nódulos. O PSA era de 4ng/ml. A Ultrassonografia de próstata por via transretal revelou uma próstata de 50g, com zona periférica sem nódulos. Foram retirados 14 fragmentos para biópsia. A biópsia revelou adenocarcinoma de próstata, Gleason 3+3, em um fragmento na base D, e o tumor representa 10% do fragmento acometido.*

Considerando esse caso, responda as questões a seguir.

- A)** Qual a classificação TNM?
- B)** Em que classificação de risco esse paciente se encontra?
- C)** Que exames ele tem de realizar para o estadiamento da doença. Justifique sua resposta.
- D)** De acordo com a National Comprehensive Cancer Network (NCCN, Versão 4.2013), qual a opção de tratamento para esse paciente?
- E)** Cite três vantagens e três desvantagens do tratamento indicado por você.

---

Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

---

**Caso Clínico 4** (2 pontos)

Uma paciente do sexo feminino, 42 anos, que foi submetida há dois anos a uma colecistectomia de urgência por colecistite aguda calculosa, evolui há três dias com quadro de dor em hipocôndrio direito, febre, calafrios e icterícia. Realizou ultrassonografia abdominal que evidenciou dilatação das vias biliares intra e extra-hepática, sugerindo cálculo residual em colédoco distal. Considerando essa situação,

- A)** Que exames laboratoriais e de imagem devem ser solicitados para essa paciente?
- B)** Cite os possíveis tratamentos que devem ser indicados para essa paciente. Justifique cada um dos tratamentos que você indicou.

---

Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

---

**Caso Clínico 5** (2 pontos)

Um paciente do sexo masculino, 52 anos, procura atendimento médico ambulatorial, queixando-se de abaulamento na região inguinal direita, que aumenta de volume e dói quando realiza algum esforço físico. Após exame físico, o médico faz o diagnóstico de diagnóstica uma hérnia inguinal do tipo IIIB na classificação de Nyhus, com fragilidade no Triângulo de Hasselbach, indicando a realização de uma herniorrafia inguinal.

Com base nesse caso,

- A) descreva os limites anatômicos do Triângulo de *Hasselbach*.
- B) cite a técnica cirúrgica convencional (aberta) mais empregada para o tratamento desse defeito herniário. Justifique sua resposta.
- C) descreva todos os passos para a realização dessa técnica.

---

Espaço destinado à Resposta

---

Fim do Espaço destinado à Resposta