

**RESIDÊNCIA MÉDICA 2014**

**Endoscopia Ginecológica**

*(Questões teórico-práticas)*

**Leia estas instruções:**

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso.
- 2 Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo.
- 3 Este Caderno contém 5 casos clínicos e suas respectivas questões. Verifique se ele está completo e sem imperfeição gráfica que impeça a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 O valor total de cada caso clínico vem indicado na própria questão.
- 5 Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
- 6 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.
- 7 O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
- 8 Você dispõe de, no máximo, três horas para responder as questões.
- 9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva este Caderno ao Fiscal.

**Assinatura do Candidato:** \_\_\_\_\_

**Caso Clínico 1** (2 pontos)

Paciente com 31 anos, gesta IV para III, com 3 partos normais, gestação no curso de 35 semanas e em trabalho de parto com 5 cm de dilatação e 3 contrações em 10min, ausculta cardíaca fetal=132 batimentos por minuto. Ao exame clínico, pressão arterial de 140x100mmHg e proteinúria de ++/++++. Com relação a essa paciente, responda:

- A)** Qual o hipotensor de preferência a ser usado para esta paciente no momento da internação?
- B)** Se a paciente, no decorrer do trabalho de parto, apresentar pressão arterial diastólica > que 110mmHg, qual o hipotensor de preferência a ser usado?
- C)** Qual a via preferencial de parto? Justifique.
- D)** Pode-se usar diuréticos para diminuir os níveis tensionais? Justifique sua resposta.

---

Espaço destinado à Resposta

---

Fim do Espaço destinado à Resposta

**Caso Clínico 2** (2 pontos)

O choque séptico é um fenômeno microbiano, caracterizado por uma resposta inflamatória à presença de microrganismos ou à invasão de tecidos normalmente estéreis do hospedeiro por estes organismos. Paciente após cesárea por amniorrexe, há mais de 24h, apresenta quadro clínico sugestivo de choque séptico. A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica é caracterizada por algumas condições. Cite 4 dessas condições.

---

Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

---

**Caso Clínico 3** (2 pontos)

Paciente Gesta I Para 0, gestação no curso de 32 semanas, colo do útero fechado e 2 contrações de 30seg em 10minutos. Ausculta cardíaca fetal=138bpm e bolsa íntegra. Gestação sem complicações e evoluindo normal até essa data. Em relação a essa paciente responda:

- A)** É necessário o uso de corticoide?
- B)** Se necessário qual a dose a ser usada?
- C)** Qual o tocolítico usado preferencialmente em função dos poucos efeitos colaterais maternos, se a propedêutica para infecção for negativa e houver bem estar fetal?
- D)** É necessário o uso de antibiótico de rotina? Justifique sua resposta.

.....  
Espaço destinado à Resposta

.....  
Fim do Espaço destinado à Resposta

**Caso Clínico 4** (2 pontos)

A endometriose é uma doença caracterizada por implante ectópico do endométrio. Cite 4 dos principais sintomas do quadro clínico de endometriose pélvica.

---

Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

---

**Caso Clínico 5** (2 pontos)

Em relação a uma paciente com diagnóstico de tricomoníase e com vida sexual ativa, responda:

- A)** Qual o tratamento a ser realizado?
- B)** Se a paciente estiver gestante com 18 semanas, qual deve ser o tratamento?
- C)** Qual o PH vaginal encontrado?
- D)** Há correlação entre o uso de álcool e o tratamento da tricomoníase? Em caso afirmativo, quais os sinais clínicos que a paciente deve apresentar para confirmar essa relação?

---

Espaço destinado à Resposta

---

Fim do Espaço destinado à Resposta