

**RESIDÊNCIA MÉDICA 2014**

**Prova Geral**

*(Questões teórico-práticas)*

**Leia estas instruções:**

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso.
- 2 Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será excluído do Processo Seletivo.
- 3 Este Caderno contém 5 casos clínicos e suas respectivas questões. Verifique se ele está completo e sem imperfeição gráfica que impeça a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 O valor total de cada caso clínico vem indicado na própria questão.
- 5 Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
- 6 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos.
- 7 O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.
- 8 Você dispõe de, no máximo, três horas para responder as questões.
- 9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva este Caderno ao Fiscal.

**Assinatura do Candidato:** \_\_\_\_\_

**Caso Clínico 1** (2 pontos)

Primigesta com 36 semanas de gestação é admitida na maternidade com queixas de náuseas, epigastralgia e cefaleia. Gesta II Para I (Parto normal). Ao exame, encontra-se eupneica, hipertensa (PA=180X120 mmHg), proteinúria de fita positiva (++) , ACF=138bpm e altura uterina de 34cm. Colo uterino pérvio para 3cm, médio e centralizado, apresentação pélvica e bolsa das águas íntegra. Exames complementares: hematócrito=40%, plaquetas=60.000/mm<sup>3</sup>, creatinina=1.5 mg/dL, LDH=1.400mg/dL, TGO=120mg/dL e TGP=240 mg/dL. Monitoragem fetal revelando boa vitalidade fetal.

Em relação a esse caso clínico, responda as questões a seguir.

- A)** Qual o diagnóstico da paciente?
- B)** Quais os três medicamentos que devem ser prescritos de imediato?
- C)** Qual a conduta a ser tomada em relação a gestação?

---

Espaço destinado à Resposta

---

Fim do Espaço destinado à Resposta

**Caso Clínico 2** (2 pontos)

Lactente de cinco meses de idade chega à consulta por apresentar evacuações líquidas, 15 vezes ao dia, em pequena quantidade, há 30 dias, com presença de raios de sangue nas fezes, há duas semanas. Sem febre ou vômitos. Calendário vacinal completo para a idade. Antecedentes gestacionais e neonatais sem alterações. Antecedentes pessoais: dois quadros de broncoespasmos há 20 e 40 dias, respectivamente, com duração de cinco dias cada, com tratamento domiciliar. Alimentação: suspensão do aleitamento materno exclusivo e introdução de fórmula infantil de partida aos 3 meses e meio de idade e de frutas e glúten uma semana após a fórmula. Ao exame físico: bom estado geral, escore Z IMC=-1,5DP, hidratado, irritado, ausculta cardiopulmonar sem alterações, abdome plano, flácido, indolor, sem massas ou visceromegalias. Toque retal: sem fezes na ampola retal, presença de pequena quantidade de sangue vivo na luva. Em relação a esse caso, responda as questões a seguir.

- A)** Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
- B)** Qual a conduta dietética adequada para o momento?
- C)** Qual o procedimento mais importante e útil para a confirmação diagnóstica?

---

Espaço destinado à Resposta

---

Fim do Espaço destinado à Resposta

**Caso Clínico 3** (2 pontos)

Uma mulher de 65 anos, 60 kg de peso, tabagista de longa data, é levada ao pronto-socorro em franca insuficiência respiratória por DPOC descompensada. Após tentativas de ventilação não-invasiva (BIPAP) e oxigenioterapia não mostrarem melhora em seu quadro, a equipe da emergência decide, então, pela ventilação invasiva.

Sabendo que a paciente será ventilada no modo pressão controlada, responda:

**A)** Qual o correto ajuste para os seguintes controles do ventilador mecânico?

1. Nível de pressão controlada em cm de água -
2. Frequência respiratória -
3. Tempo inspiratório -
4. Peep -
5. Fração inspirada de oxigênio ( $FiO_2$ ) -

**B)** Qual o volume corrente pretendido para esta paciente nos primeiros 30 minutos após a sedação e intubação oro-traqueal?

---

Espaço destinado à Resposta

**A)**

1. Nível de pressão controlada em cm de água =
2. Frequência respiratória=
3. Tempo inspiratório=
4. Peep=
5. Fração inspirada de oxigênio ( $FiO_2$ )=

**B)** Volume corrente pretendido=

---

Fim do Espaço destinado à Resposta

**Caso Clínico 4** (2 pontos)

Paciente de 67 anos, sexo feminino, relata episódios de hematoquezia às evacuações e tenesmo há 07 meses. O exame proctológico revelou lesão vegetante e infiltrante de terço médio do reto. A biópsia realizada revelou adenocarcinoma, moderadamente diferenciado. Com base nesse caso, responda as questões a seguir.

- A)** Como estabelecer o estadiamento pré-operatório do tumor?
- B)** Qual a conduta terapêutica para o caso?
- C)** Qual a recomendação para o seguimento pós-tratamento?

---

Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço destinado à Resposta

---

### **Caso Clínico 5** (2 pontos)

Você inicia seu trabalho na estratégia de saúde da família, num município de pequeno porte, na região metropolitana de Natal. No primeiro dia de trabalho, a direção da unidade lhe passa um panorama geral do serviço. Destaca que, nos últimos dois anos, já passaram três médicos em sua equipe, o que prejudicou o vínculo com a comunidade. Menciona que, para marcar consulta, o usuário tem que vir à unidade uma vez por semana, nas sextas-feiras, “pegar ficha” e que a marcação de consulta com especialistas é feita pela secretaria de saúde por meio da ficha de referência, sendo que, para algumas especialidades, a espera é de até 6 meses. Na unidade não tem material para atendimento a urgências e o paciente em situação de urgência precisa ir para UPA.

Com base nesse cenário, responda as questões a seguir.

- A)** Quais os quatro atributos essenciais da atenção primária que se encontram deficientes nesse serviço, segundo Starfield?
- B)** O médico precisa conhecer melhor o perfil epidemiológico de sua população adscrita. Que sistema que tem disponível essas informações e qual instrumento específico deste sistema contém essas informações?
- C)** A orientação comunitária é um dos atributos derivados da atenção primária à saúde. Quais as três atividades relacionadas a esse atributo que devem ser desempenhadas pelos serviços de atenção primária?
- D)** Quais as três diretrizes para a melhoria do acesso e da organização da demanda aos usuários?

---

Espaço destinado à Resposta

Mais espaço para resposta na folha seguinte

Fim do Espaço destinado à Resposta

---